



NAN H.A - Суха суміш для дітей з народження. Особливо рекомендовано для немовлят з ризиком розвитку алергії.

Протипоказання: суміш не призначена для дітей з встановленою алергією на білки коров'ячого молока (або при підозрі на неї), галактоземією, вродженою непереносимістю лактози і глюкозо-галактозною мальабсорбцією. Не для внутрішньовенного (парентерального) використання.

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/мл готової суміші
Енергетична цінність	кДж/кКал	2138 511	280 67
Жири	г/г	26,4	3,5
– з них насичені	г/г	2,5	0,3
– з них мононенасичені кислоти	г/г	16,9	2,2
– з них поліненасичені кислоти	г/г	4,7	0,6
– α-ліноленова кислота	мг/мг	330	43
– докозагексаєнова кислота	мг/мг	130	17
– лінолева кислота	мг/мг	3850	505
– арахідонова кислота	мг/мг	130	17
Вуглеводи	г/г	58,7	7,7
– з них цукри	г/г	58,7	7,7
– з них лактоза	г/г	58,7	7,7
Харчові волокна	г/г	0,0	0,0
Білки	г/г	9,7	1,3
Натрій	мг/мг	180	24
Калій	мг/мг	556	73
Хлориди	мг/мг	600	79
Кальцій	мг/мг	336	44
Фосфор	мг/мг	186	24
Магній	мг/мг	50	6,6
Залізо	мг/мг	2,5	0,33
Цинк	мг/мг	3,4	0,45
Мідь	мг/мг	0,42	0,06
Марганець	мкг/мкг	92	12
Фториди	мкг/мкг	≤ 60	≤ 7,9
Селен	мкг/мкг	29	3,8
Йод	мкг/мкг	98	13
Вітамін А	мкг/мкг RE	440	58
Вітамін D	мкг/мкг	12	1,5
Вітамін Е	мг/мг TE	13	1,7
Вітамін К	мкг/мкг	37	4,8
Вітамін С	мг/мг	70	9,2
Тіамін	мг/мг	0,50	0,07
Рибофлавін	мг/мг	1,1	0,14
Ніацин	мг/мг	5,0	0,66
Вітамін В6	мг/мг	0,36	0,05

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/мл готової суміші
Фолат	мкг/µg DFE	156	20
Вітамін В12	мкг/µg	1,4	0,18
Біотин	мкг/µg	12	1,6
Пантотенова кислота	мг/mg	5,5	0,72

Таурин	мг/mg	30	3,9
L- Карнітин	мг/mg	12	1,6
Холін	мг/mg	180	24
Інозитол	мг/mg	34	4,5
Нуклеотиди	мг/mg	15	2,0

Склад: **лактоза**, рослинні олії (соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти, соняшникова, сироватка **молочна**, мінеральні речовини (хлорид калію, гліцерофосфат кальцію, фосфат кальцію, хлорид магнію, хлорид кальцію, хлорид натрію, сульфат заліза, сульфат цинку, сульфат міді, сульфат марганцю, йодид калію, селенат натрію), жир **риб'ячий**, амінокислоти (L-аргінін, L-гістидин, L-тирозин), холіну бітарат, олія з Мортієрели Альпіни, вітаміни (С, пантотенова кислота, ніацин, Е, В2, В1, А, В6, фоліева кислота, К, біотин, D, В12), інозитол, таурин, нуклеотиди (цитидин, уридин, аденозин, гуанозин), L-карнітин, культура *Bifidobacterium Lactis*.

Вік дитини	Прокип'ячена вода, мл/мл*	Кількість мірних ложок порошку**	Кількість годувань на добу/ Суміш	Кількість годувань на добу/ Інше
1-й та 2-й тиждень	90	3	6	-
3-й та 4-й тиждень	120	4	5	-
2ий місяць	150	5	5	-
3-й та 4-й місяці	180	6	5	-
5-й та 6-й місяці	210	7	5	-
7-й - 9-й місяці	210	7	4-3	1-2***
з 10-го місяця і далі	210	7	3-2	2-3***

*Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід охолодити до температури тіла (37 °C), після чого додати суху суміш.

**Примітка: для приготування суміші необхідно користуватися мірною ложкою, заповненою без гірки. Розведення неправильної кількості порошку - більшої чи меншої порівняно з кількістю, вказаною в таблиці, - може призвести або до зневоднення організму дитини або до порушення її харчування. Вказані пропорції не можна змінювати без поради лікаря.

*** Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж вводити будь-які нові продукти в раціон дитини. Якщо лікар порекомендував вам більш раннє введення нових продуктів, зменшіть споживання суміші відповідно до рекомендацій. Потреби дитини можуть варіюватись залежно від віку.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному вигодовуванню. Ідеально їжею для немовляти є молоко матері. Грудне вигодовування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне вигодовування з використанням дитячої суміші, зверніться за порадою до лікаря.

Приготування

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитині суміш.
2. Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб усунути залишки молока. Прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накритими до використання.
3. Прокип'ятіть питну воду впродовж 5 хвилин і дайте їй охолонути до 37°C.
4. Відповідно до таблиці годування налейте точну кількість теплої води в прокип'ячену пляшечку. Потім додайте точну кількість мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Для приготування суміші використовуйте тільки мірну ложку, заповнену без гірки.
5. Переконайтеся, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші упакуйте з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

Попередження. Суміш необхідно готувати безпосередньо перед годуванням. Точно дотримуйтесь інструкції з приготування. Розведена суміш, що залишилася після годування, не підлягає зберіганню та подальшому використанню. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не захлинулася. Коли дитина підросте, переходьте на годування з чашки. Використання некип'яченої води і непрокип'ячених пляшечок, а також неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.