



Mr

NAN® без лактози (не підходить для немовлят з галактоземією та глюкозо-галактозною непереносимістю)
Суша суміш для харчування дітей з народження, у випадку, коли грудне годування неможливе.

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/мл готової суміші
Енергетична цінність	кДж/kJ ккал/kcal	2105 503	280 67
Жири	г/г	25,5	3,4
– з них насичені	г/г	2,4	0,3
– з них мононенасичені кислоти	г/г	16,0	2,1
– з них поліненасичені кислоти	г/г	4,7	0,6
– α-ліноленова кислота	мг/мг	320	43
– докозагексаєнова кислота	мг/мг	140	19
– лінолева кислота	мг/мг	4000	533
– арахідонова кислота	мг/мг	140	19
Вуглеводи	г/г	56,7	7,6
– з них цукри	г/г	8,0	1,1
– з них лактоза	г/г	< 0,050	< 0,0067
Харчові волокна	г/г	0,0	0,0
Білки	г/г	11,7	1,6
Кальцій	мг/мг	317	42
Фосфор	мг/мг	180	24
Калій	мг/мг	620	83
Натрій	мг/мг	180	24
Хлориди	мг/мг	405	54
Залізо	мг/мг	5,2	0,69
Цинк	мг/мг	3,4	0,46
Йод	мкг/μg	100	13
Селен	мкг/μg	25	3,3
Мідь	мг/мг	0,40	0,05
Магній	мг/мг	42	5,6
Марганець	мг/мг	0,14	0,02
Фториди	мкг/μg	≤ 60	≤ 8,0
Вітамін А	мкг/μg RE	400	53
Вітамін D	мкг/μg	11	1,5
Вітамін Е	мг/мг TE	16	2,1
Вітамін К	мкг/μg	45	6,0
Вітамін С	мг/мг	90	12
Тіамін	мг/мг	0,48	0,06
Рибофлавін	мг/мг	0,50	0,07
Ніацин	мг/мг	3,7	0,49
Вітамін В6	мг/мг	0,24	0,03
Фолат	мкг/μg DFE	170	23
Вітамін В12	мкг/μg	1,6	0,21
Пантотенова кислота	мг/мг	2,4	0,32
Біотин	мкг/μg	10	1,3
Холін	мг/мг	170	23
Інозитол	мг/мг	39	5,2

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/мл готової суміші
Таурин	mg/мг	34	4,5
L- Карнітин	mg/мг	9	1,2
Нуклеотиди	mg/мг	17	2,3

Мірна ложка: 4,44 г/г; 100 мл/мл = 13,32 г/г порошку + 90 мл/мл води.
Осмоляльність: 166 мОсм (mOsm)/л(L).

Склад: глюкозний сироп, рослинні олії (соняшникова з високим вмістом олеїнової кислоти, ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти, соняшникова), білок **молочної** сироватки, мінеральні речовини (хлорид калію, цитрат кальцію, цитрат натрію, фосфат натрію, оксид магнію, цитрат калію, сульфат заліза, сульфат цинку, сульфат міді, сульфат марганцю, йодид калію, селенат натрію), емульгатор лецитин **соєвий**, жир **риб'ячий**, олія з Мортієрели Альпіни, холіну бітартрат, амінокислоти (L-феніланін, L-гістидин, L-триптофан), регулятор кислотності кислота лимонна, вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, В1, А, В2, В6, фолієва кислота, К, D, біотин, В12), культура *Limosilactobacillus reuteri**, таурин, нуклеотиди (цитидин, уридин, аденозин, гуанозин), інозитол, L-карнітин.

**Limosilactobacillus reuteri* культура (ДіЕсЕм 17938) за ліцензією БІОГайя Ей.Бі.

Вік дитини	Прокип'ячена вода, мл/мл*	Кількість мірних ложок порошку **	Кількість годувань на добу/ Суміш	Кількість годувань на добу/ Інше
1-й та 2-й тиждень	90	3	6	-
3-й та 4-й тиждень	120	4	5	-
2ий місяць	150	5	5	-
3-й та 4-й місяці	180	6	5	-
5-й та 6-й місяці	210	7	5	-
7-й - 9-й місяці	210	7	4-3	1-2***
з 10-го місяця і далі	210	7	3-2	2-3***

*Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід остудити до температури тіла (37 °С), після чого додати суху суміш.

**Примітка: для приготування суміші необхідно користуватися мірною ложкою, заповненою без гірки. Розведення неправильної кількості порошку - більшої чи меншої порівняно з кількістю, вказаною в таблиці, - може призвести або о зневоднення організму дитини або до порушення її харчування. Вказані пропорції не можна змінювати без поради лікаря.

*** Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж вводити будь-які нові продукти в раціон дитини. Якщо лікар порекомендував вам більш раннє введення нових продуктів, зменшіть споживання суміші відповідно до рекомендацій. Потреби дитини можуть варіюватись щалежно від віку.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному вигодовуванню. Ідеальною їжею для немовляти є молоко матері. Грудне вигодовування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне вигодовування з використанням дитячої суміші, зверніться за порадою до лікаря.

Приготування

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитині суміш.
2. Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб усунути залишки молока. Прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накритими до використання.
3. Прокип'ятіть питну воду впродовж 5 хвилин і дайте їй охолонути до 37°С.
4. Відповідно до таблиці годування налийте точну кількість теплої води в прокип'ячену пляшечку. Потім додайте точну кількість мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Для приготування суміші використовуйте тільки мірну ложку, заповнену без гірки.
5. Переконайтеся, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші упаковку з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

Попередження. Суміш необхідно готувати безпосередньо перед годуванням. Точно дотримуйтесь інструкції з приготування. Розведена суміш, що залишилася після годування, не підлягає зберіганню та подальшому використанню. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не захлинулася. Коли дитина підросла, переходьте на годування з чашки. Використання некип'яченої води і непрокип'ячених пляшечок, а також неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.