



Nutrition



PreNAN® Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей. Суха суміш для харчування недоношених дітей та дітей з малою вагою (>1,8 кг) з народження.

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/ml готової суміші
Енергетична цінність	кДж/kJ ккал/kcal	2121 507	305 73
Жири	г/г	26,4	3,8
– з них насичені	г/г	11,0	1,6
– середньоланцюгові тригліцериди	г/г	3,3	0,5
– з них мононенасичені кислоти	г/г	8,1	1,2
– з них поліненасичені кислоти	г/г	5,6	0,8
– α-ліноленова кислота	мг/мг	420	60
– докозагексаєнова кислота	мг/мг	126	18
– ліолева кислота	мг/мг	4800	691
– арахідонова кислота	мг/мг	126	18
Вуглеводи	г/г	53,2	7,7
– з них цукри	г/г	38,0	5,5
– з них лактоза	г/г	37,0	5,3
Харчові волокна	г/г	0,0	0,0
Білки	г/г	14,2	2,0
Сіль	г/г	0,63	0,09

Натрій	мг/мг	250	36
Калій	мг/мг	580	84
Хлориди	мг/мг	380	55
Кальцій	мг/мг	570	82
Фосфор	мг/мг	350	50
Магній	мг/мг	47	6,8
Залізо	мг/мг	5,3	0,76
Цинк	мг/мг	6,0	0,86
Мідь	мг/мг	0,40	0,06
Марганець	мкг/μg	138	20
Фториди	мкг/μg	< 60	< 8,6
Селен	мкг/μg	31	4,5
Хром	мкг/μg	< 30	< 4,3
Молібден	мкг/μg	< 30	< 4,3
Йод	мкг/μg	102	15

Вітамін А	мкг/μg RE	470	68
Вітамін D	мкг/μg	13	1,8
Вітамін Е	мг/мг TE	6,2	0,89
Вітамін К	мкг/μg	30	4,3
Вітамін С	мг/мг	118	17
Тіамін	мг/мг	0,40	0,06
Рибофлавін	мг/мг	1,1	0,16
Ніацин	мг/мг	3,7	0,53
Вітамін В6	мг/мг	0,30	0,04
Фолат	мкг/μg DFE	180	26
Вітамін В12	мкг/μg	1,6	0,23

Поживна цінність	Одиниці	на 100 г/г порошку	на 100 мл/мл готової суміші
Біотин	мкг/µg	8,7	1,3
Пантотенова кислота	мг/mg	3,5	0,50
Таурин	мг/mg	30	4,3
L- Карнітин	мг/mg	20	2,9
Холін	мг/mg	170	24
Інозитол	мг/mg	135	19

Мірна ложка: 4,8 г/г; 100 мл/мл = 14,4 г/г порошку + 90 мл/мл води.
Осмолярність: 278 мОсм (mOsm)/л(l).

Склад: **лактоза**, рослинні олії (соняшникова, пальмова, кокосова, ріпакова з низьким умістом ерукової кислоти, соняшникова з високим умістом олеїнової кислоти), мальтодекстрин, сироватка **молочна**, мінеральні речовини (гліцерофосфат кальцію, хлорид кальцію, хлорид магнію, цитрат калію, цитрат натрію, хлорид калію, сульфат заліза, сульфат цинку, сульфат міді, сульфат марганцю, йодид калію, селенат натрію), середньоланцюгові тригліцириди, жир **риб'ячий**, регулятор кислотності кислота лимонна, холіну бітарtrat, олія з Мортієрели Альпіни, вітаміни (С, Е, ніацин, пантотенова кислота, В2, А, В1, В6, фолієва кислота, К, D, біотин, В12), інозитол, таурин, L-карнітин, культура Bifidobacterium Lactis.

Вага ДИТИНИ В ГРАМАХ	Прокип'ячена вода, мл/мл*	Кількість мірних ложок порошку**	Кількість годувань на добу/Суміш***
1800-3000	Відповідно до лікарських рекомендацій		
3000-4000	90	3	6
4000-5000	120	4	6
5000-6000	150	5	5
6000-7000	150	5	5
7000-8000	180	6	4

*Для збереження кількості живих бактерій у готовій суміші, прокип'ячену воду слід охолодити до температури тіла (37 °C), після чого додати суху суміш.

**Примітка: для приготування суміші необхідно користуватися мірною ложкою, заповненою без гірки. Розведення неправильної кількості порошку – більшої чи меншої порівняно з кількістю, вказаною в таблиці, – може призвести або до зневоднення організму дитини або до порушення її харчування. Вказані пропорції не можна змінювати без поради лікаря.

*** Значення в таблиці є орієнтовними. Його слід приймати за вказівкою лікаря.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Для харчування дітей грудного віку перевага надається грудному вигодовуванню. Ідеально їжею для немовляти є молоко матері. Грудне вигодовування має тривати якомога довше. Перед тим, як прийняти рішення про штучне вигодовування з використанням дитячої суміші, зверніться за порадою до лікаря.

Приготування

1. Вимийте руки перед тим, як готувати дитині суміш.
2. Ретельно вимийте пляшечку, соску та кришечку, щоб усунути залишки молока. Прокип'ятіть їх впродовж 5 хвилин. Залишайте накритими до використання.
3. Прокип'ятіть питну воду впродовж 5 хвилин і дайте їй охолонути до 37°C.
4. Відповідно до таблиці годування налейте точну кількість теплої води в прокип'ячену пляшечку. Потім додайте точну кількість мірних ложок порошку відповідно до віку Вашої дитини. Для приготування суміші використовуйте тільки мірну ложку, заповнену без гірки.
5. Переконайтеся, що ложка суха і сховайте її в банку. Після приготування суміші упаковку з порошком слід щільно закрити і зберігати в сухому прохолодному місці.
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення порошку. Перед годуванням перевірте температуру.

Попередження. Суміш необхідно готувати безпосередньо перед годуванням. Точно дотримуйтесь інструкції з приготування. Розведена суміш, що залишилася після годування, не підлягає зберіганню та подальшому використанню. Під час годування необхідно підтримувати дитину, щоб вона не захлинулася. Коли дитина підросте, переходьте на годування з чашки. Використання некип'яченої води і непрокип'ячених пляшечок, а також неправильне зберігання, транспортування, приготування і годування можуть несприятливо вплинути на здоров'я дитини.

Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування.